



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה מרפאה אורולוגית



דף הדרכה למטופל שטיפת שלפוחית השתן עם BCG

- ❖ בעקבות הניתוח והביופסיה שעברת לאחרונה, נקבע שעליך לקבל טיפול של שטיפת שלפוחית השתן עם BCG. הטיפול הזה מומלץ למטופלים עם סרטן שטחי של שלפוחית השתן בשלב מוקדם וכאשר נמצאים בסיכון לחזרת המחלה.
- ❖ מטרת הטיפול למנוע הישנות הממצאים והתפשטותם.
- ❖ השטיפה נעשית בחומר: Bacillus Calmette-Guerin (BCG) OncoTICE תמיסה של חיידק מוחלש אשר פותח במקורו כחיסון לשחפת, אך נמצא יעיל לטיפול בסרטן שלפוחית השתן השטחי.
- ❖ תוכן התמיסה יוצר מעין תגובה דלקתית בשכבה הפנימית של שלפוחית השתן ועל ידי כך מפעיל את מערכת החיסון ומשפר את יכולתו של הגוף לתקוף את הגידול ולהתנגד לו.
- ❖ הטיפול הוא ארוך טווח. הוא מתחיל בסדרה התחלתית אחת לשבוע במשך שישה שבועות. בגמר ששת השבועות תהיה הפסקה של 6 שבועות. לאחר מכן תוזמן/י לבדיקת ציסטוסקופיה.
- ❖ הטיפול ימשיך לפי הפרוטוקול בסדרת אחזקה קצרה יותר.
- ❖ כל טיפול ארוך כשעה.

לפני תחילת הטיפול:

- ❖ שבוע לפני תחילת הטיפול יש לשלוח שתן לתרבית בקופת החולים ולוודא את תוצאת הבדיקה. אם נמצאו חיידקים לא תוכל לקבל טיפול והוא ידחה עד שתרבית השתן תהיה שלילית (ללא חיידקים). יש להתקשר למכון להודיע על התוצאה. ייתכן והרופא ימליץ על טיפול אנטיביוטי.
- ❖ בבוקר הטיפול אפשר לאכול כרגיל.
- ❖ רצוי לא לשתות נוזלים כ-4 שעות לפני הטיפול – בכדי למנוע את התמלאות השלפוחית מכיוון שהדילול משפיע על יעילות הטיפול ובמיוחד משקאות המכילים קפאין – הדבר גורם לשלפוחית רגיזה.
- ❖ אם הנך מקבל תרופות משתנות – אין לקחת אותן בבוקר הטיפול אלא שעתים לאחר הטיפול.

תהליך הטיפול:

- ❖ בבואך למכון האחות תקבל אותך, במידה וזה אינו הטיפול הראשון, יש לדווח על תופעות לוואי אם היו לאחר הטיפול הקודם.
- ❖ תתבקש לגשת לשירותים לרוקן את השלפוחית.
- ❖ נבקש להוריד בגדים תחתונים, לכסות את עצמך בסדין ולשכב על הגב במיטה.



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה מרפאה אורולוגית



Organization Accredited
by Joint Commission International

- ❖ לאחר חיסוי השופכה, הרופא מורח מסכך ומאלחש, ומחדיר צינורית (קטטר) אל תוך כיס השתן.
- ❖ הרופא מרוקן את השלפוחית משתן ומחדיר את התרופה אל תוך השלפוחית דרך הקטטר (בערך חצי כוס נוזלים).
- ❖ בתום ההזלפה של החומר, מוציאים את הקטטר והנוזל נשאר בפנים על מנת לאפשר לתרופה לפעול בתוך חלל השלפוחית.
- ❖ החומר יישאר בשלפוחית כשעתיים.
- ❖ בשעה הראשונה יש לשכב ולשנות תנוחה מצד לצד כל רבע שעה כך שהתרופה תגיע לכל חלל השלפוחית.
- ❖ בסיום הטיפול תוכלי להתלבש וניתן לחזור לפעילות יום-יומית שגרתית יום למחרת. הפעולה אינה נעימה, אך לא אמורה להכאיב.

לאחר הטיפול:

- ❖ עליך להימנע משתיית נוזלים לשעתיים בהן החומר נמצא בשלפוחית.
- ❖ עליך להימנע מהטלת שתן למשך שעתיים אלו.
- ❖ בהטלת שתן ראשונה מומלץ להשתמש בכפפות. יש להתרוקן בישיבה בשירותים (נשים וגברים) במידה ויש אפשרות מומלץ להשתמש בשירותים נפרדים משאר בני הבית בכדי להימנע מהפצת החיידק וכן במשך 6 השעות הראשונות. לאחר כל התרוקנות יש להוסיף 2 כוסות אקונומיקה לשתן באסלה לכסות, ולהשאיר את חומר החיסוי והשתן כ- 15 דקות לפני הורדת המים(גם אם השירותים נפרדים משאר בני הבית).
- ❖ שעתיים לאחר מתן הטיפול (לאחר התרוקנות ראשונה) יש להגדיל את כמות השתייה כדי לשטוף את השלפוחית יש להקפיד לא להשאיר את התמיסה בשלפוחית מעבר לשעתיים.
- ❖ כדי למנוע זיהומים מומלץ לרחוץ היטב ידיים לאחר כל התרוקנות.
- ❖ מומלץ לקיים יחסי מין עם קונדום בלבד, במשך שבעה ימים לאחר כל טיפול.
- ❖ לנשים מומלץ לא להרות משך כל תקופת הטיפול.

תופעות לוואי אפשריות ב 48 - 24 שעות לאחר הטיפול:

- ❖ תכיפות/דחיפות/צריבה במתן שתן.
- ❖ דימום קל בשתן.
- ❖ ביום הטיפול יתכן חום, אי מנוחה, עייפות וחולשה כמו סימני שפעת. ניתן לקחת כדור להורדת חום.
- ❖ כאבי פרקים, בחילות, הקאות, כאבי ראש, שיעול, פריחה.



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה מרפאה אורולוגית



Organization Accredited
by Joint Commission International

יש לפנות מיד לרופא או למוקד רפואי זמין:

- ❖ במקרה של דימום משמעותי שלא חולף עם שתייה מרובה.
- ❖ חום מעל 38.5 או צמרמורת יותר מפעם אחת.
- ❖ עצירות שתן.
- ❖ הרגשה כללית בלתי סבירה כגון: סחרחורת, התעלפות.
- ❖ שינויים והנחיות אחרות יתכנו בהתאם למצב החולה או הוראות הרופא.
- ❖ במקרה ויהיו לך שאלות נוספות וכן לעדכון לגבי תוצאות התרבית,
לפנות לאחות במכון האורולוגית : 04-6652410 בין השעות 08:00-15:00

אנו מקווים שדף הדרכה זה ישרת אותך במהלך שהייתך במרפאה ובהחלמתך.
צוות המרפאה ישמחו לענות על שאלות נוספות.
החלמה מהירה!!