



ניתוח טחורים בדופלר בשיטת HAL

רקע:

טחורים הם התבלטות של הרירית ותת הרירית של החלחולת ופי הטבעת הנגרמת כתוצאה מכלי דם גדושים ומורחבים. הטחורים יכולים להיות פנימיים INTERNAL HEMORRHOIDS או חיצוניים EXTERNAL HEMORRHOIDS. התסמינים השכיחים של טחורים הינם דימומים, גרד וגירוי מקומי, כאבים וצניחת טחורים.

הטיפול הניתוחי:

ניתוח טחורים בדופלר מתבצע בעזרת מתקן אולטרסאונד קטן המוחדר בעדינות אל פי הטבעת. האות הקולי מאפשר לאתר את מיקומם המדויק של העורקים המספקים דם לטחורים. המנתח קושר כל עורק ע"י תפירה סביבו וקשירת הקצוות. כשאספקת הדם לטחורים נחסמת הלחץ בהם פוחת באופן מיידי והם מתחילים להתכווץ. תוך שבוע עד שבועיים כבר לא ניתן להבחין בהם והתסמינים נעלמים.

הרדמה, טשטוש ואלחוש:

ניתוח טחורים בדופלר מתבצע תחת הרדמה מלאה, אזורית או מקומית. האזור בו מתבצעת התפירה והקשירה של העורקים הוא אזור אל-חוש, אך ההרדמה מסייעת להרגיש נוחות בעת החדרת מכשיר הדופלר. הבחירה בסוג ההרדמה (אזורית או מקומית) תלויה בין היתר במצבך הרפואי הכללי ובהעדפת המנתח.

הכנות לקראת הניתוח:

- יש להיות בצום מוחלט מחצות הלילה שלפני הניתוח.
- יש להצטייד בבדיקות כפי שהתבקשת. הבדיקות הבסיסיות הן בדיקות דם הכוללות ספירת דם, מלחים בדם, תפקודי כבד וקרישה. מעבר לגיל 40 יש צורך בצילום חזה ותרשים א.ק.ג. בדיקות נוספות יתבקשו בהתאם למצב הרפואי.
- ערה הניתוח תיבדק ע"י מרדים ותיקבע סוג ההרדמה המתאימה לך. במידה והינך נוטל תרופות קבועות יש להתייעץ עם הרופא המרדים או המנתח באם יש צורך בשינוי או הפסקת תרופה, במיוחד כשמדובר באספירין או תרופות נוגדות קרישה.
- יש להתקלח בערב שלפני הניתוח או בבוקר הניתוח.

התאוששות והחלמה:

התאוששות מניתוח טחורים נחשבת לקצרה ופשוטה. ניתן להשתחרר מבית החולים למחרת בבוקר. בדרך כלל אין כאבים, אך במידת הצורך תוכל לפנות אל צוות המחלקה שיוכל לעזור במשככי כאבים לפי הצורך. לעיתים יש הרגשת מלאות באזור הרקטום וצורך ללכת לשירותים. דימום קל יכול להימשך עד כשישה שבועות לאחר הניתוח. מומלץ להשתמש בחומר מרכז יציאות למשך כחודש ימים לאחר הניתוח. בשחרורך מהמחלקה תקבל/י זימון לביקורת אצל הרופא המנתח במרפאה הכירורגית.

לנוחיותך צוות מחלקת כירורגיה עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף.

איחולי החלמה מלאה ורפואה שלמה.
צוות המחלקה