

ניקור עור התוף והחדרת צינורית אוורור

רקע

הסיבה השכיחה ביותר לכאבי אוזניים אצל ילדים הינה זיהום של האוזן התיכונה, הגורם להופעת דלקת מכאיבה. דלקת באוזן התיכונה נוצרת, בד"כ, כתוצאה מזיהום של חידקים או נגיפים המגיעים אל האוזן דרך חצוצרת השמע ולעיתים באמצעות זרם הדם. כתוצאה מכך, או כתוצאה מחסימה של חצוצרת השמע מצטברים נוזלים ומוגלה בחלל האוזן התיכונה. למרות שליקוי זה עלול להתפתח בכל הגילאים, הוא שכיח ביותר אצל ילדים, בעיקר בגילאים שבין שלושה חודשים לשלוש שנים.

ניצוד מטפלים בהצטברות נוזלים

במקרים של הצטברות נוזלים או מוגלה, ניתן לבצע חיתוך (ניקור) של עור התוף, כדי ליצור בו פתח שדרכו שואבים את הנוזלים מחלל האוזן התיכונה.

ניצוד מטפלים בחסימת חצוצרת השמע

חצוצרת השמע הינה צינור קטן המחבר את האוזן התיכונה עם החלק האחורי של האף, על מנת לאפשר לאוויר להיכנס אל האוזן התיכונה. חצוצרת השמע מסיימת לשמור על לחץ אוויר שווה משני הצדדים של עור התוף. במקרים בהם נחסמת חצוצרת השמע ניתן לבצע ניקור של עור התוף, ומיד לאחר מכן, להחדיר צינורית מיוחדת הבולטת מחוץ לעור התוף ומונעת את סגירת החתך. באופן הזה מאפשרים לנוזל להתנקז ולאוויר להיכנס מהאוזן התיכונה. צינורית האוורור, הנקראת גם "כפתור", בד"כ נפלטת בתוך כשנה והנקב נסגר באופן עצמוני. אצל ילדים מתבצע ניתוח של ניקור עור התוף והחדרת צינורית אוורור בהרדמה כללית ובחדר ניתוח. אצל מבוגרים ניתן לבצעו בהרדמה מקומית ובמרפאה.

בהצלחה וברכת החלמה מהירה!