

## עלון מידע

### ניתוח כריתת טחורים

#### רקע:

טחורים הם התבלטות של הרירית ותת הרירית של החלחולת ופי הטבעת הנגרמת כתוצאה מכלי דם גדושים ומורחבים. הטחורים יכולים להיות פנימיים INTERNAL HEMORRHOIDS או חיצוניים EXTERNAL HEMORRHOIDS. התסמינים השכיחים של טחורים הינם דימומים, גרד וגירוי מקומי, הפרשות, כאבים וצניחת טחורים.

#### הטיפול הניתוחי:

ניתוח כריתת טחורים מתבצע בעזרת מרחיב המוחדר בעדינות לתוך פי הטבעת, אשר בעזרתו ניתן לאבחן את מצב הטחורים הפנימיים ולטפל בהם בהתאם. הכריתה מבוצעת בעזרת מכשיר אנרגיה אשר מבצע סגירה חמה של כלי הדם ולאחר מכן כריתה של קבוצת הטחורים.

#### הרדמה, טשטוש ואלחוש:


ניתוח כריתת טחורים מבוצע בהרדמה מלאה או אזורית, בתוספת הרדמה מקומית לפי הצורך. הבחירה בסוג ההרדמה (אזורית או מקומית) תלויה בין היתר במצב הרפואי הכללי ובהעדפת המנתח.

#### הכנות לקראת הניתוח:

- יש להיות בצום מוחלט מחצות הלילה שלפני הניתוח.
- יש להצטייד בבדיקות כפי שהתבקשת. הבדיקות הבסיסיות הן בדיקות דם הכוללות ספירת דם, מלחים בדם, תפקודי כבד וקרישה. מעבר לגיל 40 יש צורך בצילום חזה ותרשים א.ק.ג. בדיקות נוספות יתבקשו בהתאם למצב הרפואי.
- ערב הניתוח תיבדק ע"י מרדים ותיקבע סוג ההרדמה המתאימה לך. במידה והינך נוטל תרופות קבועות יש להתייעץ עם הרופא המרדים או המנתח באם יש צורך בשינוי או הפסקת תרופה, במיוחד כשמדובר באספירין או תרופות נוגדות קרישה.
- יש להתקלח בערב שלפני הניתוח או בבוקר הניתוח.

#### התאוששות והחלמה:

לאחר הניתוח תטופלי במשככי כאבים ומרככי צואה. ניתן להשתחרר מבית החולים למחרת הניתוח. בשחרור תקבל מרשם לתרופות לשימוש בבית, לפי הצורך. ניתוח כריתת טחורים מאופיין בכאב בתר ניתוחי הנמשך כשבועיים עד ארבעה שבועות, אך תוכלי להיעזר במשככי כאבים כולל שילוב בין סוגים כפי המותר. לעיתים יש הרגשת מלאות באזור הרקטום וצורך ללכת לשירותים. דימום קל יכול להימשך עד כשישה שבועות לאחר הניתוח. בשחרורך מהמחלקה תקבלי זימון לביקורת במרפאה הכירורגית.



בברכת החלמה מהירה  
צוות המחלקה הכירורגית