



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מסוף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל
The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya
Affiliated to The Faculty of Medicine in Galilee - Bar Ilan University



Organization Accredited
by Joint Commission International

Глазное отделение

Зав. отделения:

Д-р Ханин Джабали-Хабиб

Тел. глазной клиники - 04-6652226

Факс для назначения очереди в глазной
клинике - 04-6652748

ניתוח ויטרוэктомיה

Витроэктомия

Витроэктомия является операцией по удалению стекловидного тела. Операция проводится под местной или общей анестезией в зависимости от продолжительности операции и желания пациента. Во время операции делаются небольшие разрезы на стенке глаза, через которые хирург вставляет хирургические инструменты. Причины проведения витроэктомии разнообразны: лечение макулярного отверстия, удаление мембраны с поверхности сетчатки, кровоизлияние в стекловидном теле или отслоение сетчатки.

В первой части витроэктомии стекловидное тело удаляется и заменяется прозрачной жидкостью, подходящей для поддержания надлежащего функционирования глаза. Если выполняется операция по исправлению отслоения сетчатки, сетчатка во время операции прикрепляется к стенке глаза. Разрыв сетчатки закрывается с помощью лазеркоагуляции. После возвращения сетчатки на её нормальное место хирург заполняет полость глаза газом или жидким силиконом.

Через несколько недель после операции глазная жидкость постепенно заменит газовый пузырь, и он исчезнет из глаза. В ходе витроэктомии с целью исправления макулярного отверстия или мембраны сетчатки по окончании удаления стекловидного тела производятся исправления зрительного центра.

Сегодня значительная часть операций витроэктомии выполняется посредством небольших разрезов, не требующих зашивания в их конце, период послеоперационного восстановления и ощущение дискомфорта в первые дни после операции очень непродолжительны.

Большая часть этих операций проводится под местной анестезией, но иногда из-за сложного состояния глаза пациента или его частичного сотрудничества они проводятся под общим наркозом.

Пациентам, которым в конце операции был введён газ, рекомендуется лежать на животе или на боку в первые дни после операции, что помогает в улучшении хирургических результатов.

Персонал отделения желает Вам успешной операции!